

< 福山市 こどもの定期接種一覧表 >

【福山市の乳幼児等定期接種について】
詳細はこちらから➡



2026年(令和8年)4月作成

□ 対象年齢 (— 対象年齢のうち、接種を受けるのが望ましい時期)

ワクチン	生後 1 2 3 4 5 6 7 8 月 月 月 月 月 月 月 月 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳	接種回数	対象年齢 (対象年齢内の接種は無料です)	望ましい時期	間隔	
BCG (結核)		1回	1歳に至るまで	生後5か月から8か月に至るまで	—	
B型肝炎	1回目・2回目・3回目 	1回	1歳に至るまで	生後2か月から9か月に至るまで	—	
		1回			1回目終了後、27日以上の間隔をおく	
		1回			1回目終了後、139日以上の間隔をおく	
ロタウイルス	ロタリックス(1価ワクチン) 1回目・2回目 	1回	出生6週0日後から24週0日後まで	生後2か月から14週6日後まで	—	
		1回		2回目	—	1回目終了後、27日以上の間隔をおく
	ロタテック(5価ワクチン) 1回目・2回目・3回目 	1回	出生6週0日後から32週0日後まで	生後2か月から14週6日後まで	—	
		1回		2回目	—	1回目終了後、27日以上の間隔をおく
		1回		3回目	—	2回目終了後、27日以上の間隔をおく
		3回		初回	接種開始が生後2か月から7か月に至るまで	27日以上の間隔をおく (標準的には生後12か月までに3回接種)
小児用肺炎球菌	初回・追加 	1回	生後2か月から60か月に至るまで	生後12か月から15か月に至るまで	初回終了後、60日以上の間隔をおく (生後12か月以降に行うこと)	
		3回	追加	—	—	
5種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib(ヒブ))	1期初回・1期追加 	3回	生後2か月から90か月に至るまで	生後2か月から7か月に至るまで	20日以上(標準的には56日まで)の間隔をおく	
		1回		1期追加	1期初回終了後6か月から18か月に至るまで	1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期 	1回	11歳以上13歳未満	11歳	—	
麻しん風しん混合 麻しん(単独) 風しん(単独)	1期 	1回	生後12か月から24か月に至るまで	—	—	
		1回	2期 (就学前1年間)	5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間	—	—
水痘 (水ぼうそう)	1回目・2回目 	1回	生後12か月から36か月に至るまで	生後12か月から15か月に至るまで	—	
		1回		2回目	1回目終了後6か月から12か月に至るまで	1回目終了後、3か月以上の間隔をおく
日本脳炎	1期初回・1期追加 	2回	生後6か月から90か月に至るまで	3歳	6日以上(標準的には28日まで)の間隔をおく	
		1回		1期追加	4歳	1期初回終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおく
		1回		2期	9歳以上13歳未満	9歳
HPV (ヒトパピローマウイルス)	※15歳未満で接種を開始する場合は、2回で接種完了。 	3回	小学校6年生～高校1年生 相当年齢の女子	中学1年生	< 初回接種が15歳未満 > 2回目は、1回目の接種後6か月の間隔をおく < 初回接種が15歳以上 > 2回目は、1回目の接種後2か月の間隔をおく 3回目は、1回目の接種後6か月の間隔をおく	

※接種間隔を27日間以上あける場合は、接種した日から次の接種を行う日までの間隔を27日間以上おきます。例えば4月1日に接種した場合は、4月29日から接種可能です。

※年齢の計算について、対象年齢の「生後2か月から90か月に至るまで」とは、4月1日生まれの人であれば5月31日から7年後の9月30日までの接種が可能であり、「11歳以上13歳未満」とは、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までの接種が可能です。

※出生6週0日後とは、出生日の6週間後の当日をさすものです。例：2025年11月1日生まれの人の場合、出生6週0日後は12月13日を指します。

※5種混合の接種が望ましいですが、3種混合、ポリオ及びHib(ヒブ)での接種も可能です。

※2026年(令和8年)4月から、RSウイルス感染症予防接種の定期接種が始まりました。接種対象者は、妊娠28週～37週に至るまでの者です。